

Vážení spoluobčané,


dovolujeme si Vás touto formou oslovit s žádostí o **spolupráci při boji proti invaznímu druhu rostliny, netýkavce žláznaté (*Impatiens glandulifera*) v rámci intravilánu místní části Chlébské**. Tato 1 až 2,5 m vysoká, na první pohled ozdobná, medonosná rostlina, s velkými růžovými vonnými květy a dutým stonkem je nepůvodním druhem naší flóry, který byl v 19. století do Evropy dovezen jako okrasná rostlina z Himaláji, která se však začala nekontrolovatelně šířit naší krajinou a vytlačovat domácí, přirozeně se vyskytující druhy rostlin. Likvidace invazního druhu netýkavky žláznaté je pozitivním a bezesporu **nutným zásahem z hlediska zachování přírodní a krajinářské cennosti údolí Chlébského potoka**, především, nachází-li se nad uvedeným úsekem zvláště chráněné území a v celé délce vodního toku se po březích nachází zvláště chráněný druh bledule jarní (*Leucojum vernum*).



**V intravilánu obce Chlébské byly zjištěny touto dobou již kvetoucí a semenící rostliny, rostoucí místy přímo v náplavách v korytě toku, ojediněle jednotlivé rostliny v břehových porostech, pouze ve třech místech vytváří kompaktní porost o velikosti cca 40 m<sup>2</sup>.**

Vzhledem k omezenému výskytu netýkavky žláznaté je vhodné k její **likvidaci využít** mechanické metody, a to **vytrhávání rostlin**, případně **pokosení** kompaktních porostů netýkavky.

- Vhodné je oddělení kořenů od lodyhy a minimálně jednou či dvakrát zalomit vytržené rostliny tak, aby se zabránilo regeneraci a vytváření adventivních kořenů z kolének.
- Vytržené rostliny je vhodné ukládat na osluněná místa mimo dosah potoka (či vlhkých míst), aby rostliny nebyly schopné regenerovat.
- Zásah má být optimálně proveden nejpozději v období prvních květů, kdy netýkavka dosahuje výšky zhruba 1 m, dříve než začne vytvářet semena. Při brzkém zásahu rostliny regenerují, při pozdějším (po odkvětu) dozrávají semena a dochází k dalšímu šíření a obnovování zásoby semen v půdě.



Netýkavka žláznatá je jednoletý druh, který se rozmnožuje pouze semeny. Většina (95 %) semen v semenné bance klíčí hned následující sezónu, tj. nepřeléhají a **při pravidelné důsledné likvidaci všech rostlin je během několika let z lokality vymístěna**. Druh se velmi dobře šíří vodou a podél komunikací, **důležité je proto porost likvidovat vždy celý a likvidaci začínat na horním toku a pokračovat po celém povodí**.